

Erfassungsbogen für Kontaktpersonen zu Patient:

(Bitte geben Sie, soweit vorhanden, die Flug- bzw. Reisedaten des Patienten so exakt wie möglich an!)

Name: _____ Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ Arzt: _____
 (Flug-) (Flug-) Reihe Reihe
 Linie: _____ Nummer: _____ u. Sitzplatz: _____ von Datum: _____ Uhrzeit: _____ bis Datum: _____ Uhrzeit: _____
 (Flug-) (Flug-) Reihe Reihe
 Linie: _____ Nummer: _____ u. Sitzplatz: _____ von Datum: _____ Uhrzeit: _____ bis Datum: _____ Uhrzeit: _____

Name d. Kontaktperson	Vorname	geboren	Straße/Hausnummer PLZ/Ort	Telefon privat beruflich	Beruf	Kontakt-		Kategorie*	Sitzplatz**
						Datum	Symptome		
		tt.mm.jj				tt.mm	ja/nein	Ia, Ib, II, III	Reihe Sitz

** Sitzplatz im Flugzeug etc., sofern Kontakt während der Reise stattfand
 * zur Einteilung s. Rückseite

Risikodifferenzierung von VHF-Kontaktpersonen

Als Kontaktpersonen gelten alle Personen, die seit Beginn der Symptome des Patienten Kontakt hatten:

- mit dem Erkrankten
- zu Körperflüssigkeiten des Erkrankten
- zu kontaminierten Gegenständen oder
- sich im gleichen Zimmer, Transportmittel etc. befanden.

Kategorie Ia:

Kontaktpersonen mit hohem Risiko

- Personen, die direkten Schleimhaut- oder invasiven Hautkontakt mit Blut, anderen Körperflüssigkeiten oder Geweben des Patienten hatten (z. B. durch eine Nadelstichverletzung, bei einem invasiven Eingriff, einer Reanimation oder einer Autopsie)

Kategorie Ib:

Kontaktpersonen mit erhöhtem Risiko

- Personen, die Kontakt mit Blut, anderen Körperflüssigkeiten oder Geweben des Patienten auf intakter Haut oder als Aerosol hatten (z. B. Krankenpflege- oder ärztliches Personal, Labormitarbeiter, Reinigungspersonal in vorbehandelnden Einrichtungen, ggf. Mitarbeiter externer Untersuchungslabors)
- Personen, die mit Blut, Exkreten, Geweben oder dem Kadaver eines Tieres, das nachweislich mit VHF infiziert war, in Berührung gekommen sind

Kategorie II:

Kontaktpersonen mit mäßigem Risiko

- Personen, die den Patienten gepflegt oder Untersuchungsproben von ihm bearbeitet haben (z. B. Mitglieder einer Lebens- oder Wohngemeinschaft, betreuende Freunde oder Nachbarn, ggf. vor der Krankenhausaufnahme konsultierte Ärzte, Krankentransportpersonal, betreuendes Krankenhauspersonal einschl. Ärzten, Reinigungspersonal etc.)
- Personen, die unmittelbaren Kontakt mit der Leiche eines an VHF verstorbenen Patienten oder dessen Verdächtigen hatten, bevor der Sarg verschlossen wurde
- Personen, die Kontakt zu einem Tier hatten, das mit VHF infiziert war
- Personen, die z. B. während eines längeren Fluges in unmittelbarer Nachbarschaft des Indexpatienten gesessen haben, sofern dieser bereits symptomatisch war
- Personen, die direkten Kontakt mit der Kleidung, dem Bettzeug oder anderen Gegenständen hatten, die mit Blut, Urin oder anderen Körperflüssigkeiten des Patienten kontaminiert gewesen sein könnten

Kategorie III:

Kontaktpersonen mit geringem Risiko

- jegliche andere Art von Kontakten zum Indexpatienten (z. B. Aufenthalt im gleichen Raum, Benutzung der gleichen öffentlichen Transportmittel, allgemeine soziale Kontakte)
- medizinisches Personal, sofern intakte Schutzanzüge und Respiratoren getragen wurden